



Le spécialiste de l'hygiène de l'environnement animal

## Fiche maladie

### → La Toux des Chenils



La **toux des chenils** (ou trachéo-bronchite infectieuse) est une maladie extrêmement contagieuse des **voies respiratoires du chien**, atteignant principalement les **animaux vivant en collectivité** (élevages, refuges, etc.). Elle est due à **plusieurs agents pathogènes** : bactéries et virus associés. Chacun de ces microorganismes peut être individuellement à l'origine des symptômes de la maladie mais la pathologie peut également se développer lors de leur présence simultanée.

### Mode de transmission

La **contamination se fait par contact** avec un chien malade (contact rapproché dit « **nez-à-nez** ») et par les aérosols (postillons) dus à la toux. **La maladie se développe rapidement** : 5 à 10 jours suffisent après l'exposition aux microbes. Tous les chiens susceptibles d'entrer en contact avec d'autres chiens sont donc potentiellement exposés. Ainsi, **les expositions ou tout autre rassemblement de chiens** (courses, agility, chasse, etc.) sont des lieux propices à la transmission de cette maladie.



### Sujets et périodes à risque

La maladie est plus **fréquente en automne et hiver**. Les **jeunes chiens**, qui n'ont jamais été vaccinés ou qui n'ont jamais été en contact avec les agents infectieux responsables, courent plus de risques. De même, **les chiens en état d'immunodépression** (parasités, souffrant d'une autre maladie ou recevant certains médicaments) sont plus réceptifs.

## Symptômes

Le principal symptôme de la toux des chenils est, comme son nom l'indique, **une toux sèche, forte et quinteuse** comme si le chien voulait « cracher » quelque chose. L'état général est souvent atteint et la **fièvre fréquente**.

Des **conjonctivites** (œil rouge) et des **écoulements par le nez et les yeux peuvent également apparaître**. Enfin, des complications bactériennes sont possibles : forte fièvre, chien plus abattu, toux devenant grasse, la maladie évolue alors en bronchopneumonie, pouvant s'avérer mortelle chez les chiots.



## Comment prévenir la maladie ?

Plusieurs **vaccins** existent contre les différents agents de la toux de chenil. La protection n'est pas efficace à 100% mais permet d'atténuer considérablement les symptômes de la maladie. Et compte tenu du mode de transmission de cette maladie, en plus de la vaccination, **il est essentiel d'assurer dans les collectivités une hygiène adéquate et rigoureuse de l'environnement**.

Pour cela SANITERPEN recommande d'utiliser le **SANITERPEN DÉSINFECTANT PLUS Fraicheur verte** quotidiennement et le **SANITERPEN DÉSINFECTANT 90** de manière ponctuelle.



Flacon 1L



Bidon 5L



Flacon 1L



Bidon 5L

## CONSEIL

En collectivité, l'usage quotidien du SANITERPEN PLUS FRAICHEUR VERTE assure une désinfection bactéricide efficace. Diluer à 1 %, soit 10 cl de produit pour 10 L d'eau.

Pour prévenir la maladie et compléter l'action bactéricide, il est recommandé d'utiliser de manière ponctuelle et en cas de maladie déclarée le SANITERPEN DÉSINFECTANT 90, actif contre les virus à la dose de 2 % (soit 20 cl pour 10 litres d'eau).

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.