



Le spécialiste de l'hygiène de l'environnement animal

## Fiche maladie

### → La maladie de Carré



La **maladie de Carré** est une **maladie virale très contagieuse**. Cette maladie peut provoquer des signes cliniques peu marqués chez certains chiens, mais être mortelle chez d'autres et en particulier chez les chiots : le taux de guérison est presque nul.

### Mode de transmission

L'infection se produit principalement par l'**intermédiaire d'aérosols**, c'est-à-dire de petites particules transportées dans l'air : lorsqu'un chien éternue par exemple, il peut transmettre le virus. La transmission peut également se faire lors d'un **contact rapproché avec un autre chien**. On parle alors de « nez-à-nez ».



La période d'incubation peut durer jusqu'à trois semaines. **Le virus est un gros virus, il ne survit pas facilement dans l'environnement et est détruit par les désinfectants.**

Le virus en cause, proche de celui de la rougeole, est surtout rencontré dans les endroits où il y a une **forte concentration de chiens** comme les élevages, les animaleries, les refuges, etc.

### Symptômes

Les **premiers signes de la maladie sont respiratoires** : écoulements oculaire et nasal et toux. Ensuite, un abattement, une perte d'appétit, des vomissements et des diarrhées sont observés. Dans les derniers stades de la maladie, les chiens peuvent présenter un épaissement cutané au niveau de la truffe et des coussinets (on parle d'hyperkératose). Les chiens qui survivent présentent parfois des complications neurologiques, par exemple des crises convulsives.

## Comment prévenir la maladie ?

Au-delà du vaccin, la prévention passe également par le **maintien d'une bonne hygiène générale** qui **permet d'inactiver le virus** ici en cause et de limiter une contamination générale dans les élevages et autres lieux sensibles.

Pour cela, **Saniterpen préconise le nettoyage régulier des locaux et des matériels** avec le **SANITERPEN DÉTERGENT SURPUISSANT** qui va permettre l'élimination des salissures et matières organiques tout préparant favorablement l'action du Désinfectant.



Flacon 1L



Bidon 5L

Procéder ensuite à une désinfection rigoureuse de ces mêmes surfaces et matériels, avec le **SANITERPEN DÉSINFECTANT 90**. Diluer le produit à 2% et procéder à une application par pulvérisation. Bien laisser sécher avant de réintroduire les animaux.



Flacon 1L



Bidon 5L



Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.