

FICHE MALADIE


La Leishmaniose

La **Leishmaniose** est une maladie parasitaire chronique grave. Elle est transmise par le biais de piqûres d'insectes volants appelés « **phlébotomes** » et menace chaque année 2,5 millions de chiens en Europe et plus d'un million uniquement en France. En France, elle est principalement retrouvée dans le **sud du pays** et tout autour du pourtour méditerranéen

Mode de transmission

La Leishmaniose est provoquée par des unicellulaires microscopiques du nom de *Leishmania infantum*, transmis au chien par un petit insecte piqueur, le phlébotome, aussi appelé mouche des sables.

Le phlébotome est un petit **moustique très velu** d'environ 3 millimètres. Il vit dans les forêts de chênes verts. Il est **actif la nuit** : c'est à la tombée du jour qu'il pique. Son vol est silencieux et ne s'élève pas au dessus d'un mètre. Ce petit moustique ne s'attaque que très rarement aux chats. **Les chiens sont les premiers concernés.**



Zones et périodes à risque

Le phlébotome est très répandu dans les **pays méditerranéens**. En France, les régions **PACA** et **Occitanie** sont tout particulièrement exposées. Le réchauffement climatique tend toutefois à étendre cette zone géographique. En effet, l'insecte est aujourd'hui retrouvé en région **Auvergne-Rhône-Alpes** et jusqu'en **Andorre**.



Le risque de contamination et de piqûres est particulièrement élevé **entre avril et octobre**. Ceci étant, la période à risque s'allonge avec des **températures douces et printanières** et tous les moyens de prévention doivent être mis en place pour protéger nos animaux.

Symptômes

La Leishmaniose provoque chez le chien des **symptômes graves et durables** qui peuvent apparaître plus ou moins longtemps après la piqûre d'insecte.

Les premiers symptômes de la maladie se traduisent par une **chute de poils** principalement localisée autour des yeux et du museau. A un stade plus avancé, le **chien maigrit**, bien qu'il conserve son appétit. Des **lésions cutanées** peuvent également se développer sur les parties du corps en contact avec le sol lorsque le chien s'assied ou se couche. Les parties les plus touchées sont la tête et les pattes. Enfin, au stade le plus critique, les **griffes deviennent longues et cassantes**. Les articulations et les reins peuvent être atteints. Dans de tels cas, le **pronostic vital est alors engagé**.

Certains traitements contre la Leishmaniose existent et s'avèrent efficaces. Toutefois, ils doivent être suivis à vie car cette maladie ne se guérit jamais totalement.




Comment prévenir la maladie ?

Pendant longtemps, aucun traitement n'était disponible et seule une bonne hygiène de l'environnement permettait d'éviter la contamination. Désormais, **un vaccin existe** mais avant l'âge de 6 semaines, les chiots ne peuvent pas être vaccinés et sont alors particulièrement vulnérables

En complément de la vaccination et pour tous les animaux non vaccinés et les chiots, il est recommandé en période à risque, de **garder les chiens à l'intérieur** dès la tombée du jour et de **traiter leur environnement** (maison, chenil, niche, cage de transport, etc.) avec un insecticide à base de deltaméthrine, substance insecticide efficace contre le phlébotome et **reconnue par l'OMS**.

A ce titre, notre **SANITERPEN Insecticide DK CHOC**, formulé à base de deltaméthrine, est particulièrement recommandé pour le traitement de l'environnement animal. Et pour un traitement d'appoint, utilisez le **SANITERPEN Insecticide DK CHOC prêt à l'emploi**, en spray.

	Produit	Dilution	Cibles	Méthodes
TRAITEMENT INSECTICIDE				
Cages, matériels, parties communes, mangeoires, niches	SANITERPEN INSECTICIDE DK CHOC */** 	Arrosage : 50 ml de produit dans 2,5 litres d'eau froide pour traiter 9,5 à 10 m ² Pulvérisation : 50 ml de produit dans 0,5 litre d'eau froide pour traiter 9,5 à 10 m ²	Mouches, moustiques, puces, poux, poux rouges	<ul style="list-style-type: none"> Diluer le produit au dosage adéquat Faire sortir les animaux Appliquer en évitant le ruissellement et en insistant autour des portes et fenêtres Laisser sécher et surtout NE PAS RINCER Réintroduire les animaux dans les locaux après séchage complet

* Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. ** Dangereux, respecter les précautions d'emploi.