

FICHE MALADIE

La Maladie de Carré

La **Maladie de Carré** est une **maladie virale très contagieuse**. Cette maladie peut provoquer des signes cliniques peu marqués chez certains chiens, mais être mortelle chez d'autres et en particulier chez les chiots : le taux de guérison est presque nul.

Mode de transmission

L'infection se produit principalement par **l'intermédiaire d'aérosols**, c'est-à-dire de petites particules transportées dans l'air : lorsqu'un chien éternue par exemple, il peut transmettre le virus. La transmission peut également se faire lors **d'un contact rapproché avec un autre chien**. On parle alors de nez-à-nez.

La période d'incubation peut durer jusqu'à trois semaines mais le virus **ne survit pas facilement dans l'environnement et est aisément détruit par les désinfectants**.

Le virus en cause, proche de celui de la rougeole, est surtout rencontré dans les endroits où il y a une **forte concentration de chiens comme les élevages, animaleries, refuges, etc.**

Symptômes



Les **premiers signes de la maladie sont respiratoires** : écoulements oculaire et nasal et toux. Ensuite, un abattement, une perte d'appétit, des vomissements et des diarrhées sont observés. Dans les derniers stades de la maladie, les chiens peuvent présenter un épaissement cutané au niveau de la truffe et des coussinets (on parle d'hyperkératose). Les chiens qui survivent présentent parfois des complications neurologiques comme des crises convulsives.



Comment prévenir la maladie ?

Au-delà du vaccin, la prévention passe également par le **maintien d'une bonne hygiène générale** qui **permet d'inactiver le virus** ici en cause et de limiter une contamination générale dans les élevages et autres lieux sensibles.

Pour cela, **SANITERPEN préconise le nettoyage régulier des locaux et des matériels** permettant l'élimination des salissures et matières organiques tout préparant favorablement l'action du désinfectant.

	Produit	Dilution	Cibles	Méthodes
NETTOYAGE				
Cages, locaux, matériels	SANITERPEN DETERGENT SURPUISSANT ** 	5% 50mL de produit par litre d'eau	Saletés diverses	<ul style="list-style-type: none"> • Evacuer tous les résidus • Diluer le produit à 5% • Laver puis rincer au jet d'eau
DESINFECTION				
Cages, locaux, matériels	SANITERPEN DESINFECTANT 90 **/* 	2% 1L de produit pour 50L de solution pour 170 m2	Bactéries, virus, champignons	<ul style="list-style-type: none"> • Diluer le produit à 2% • Sortir les animaux et appliquer la solution par pulvérisation • Laisser sécher et ne réintroduire les animaux que lorsque les lieux sont entièrement secs • Pour le matériel, laisser sécher puis rincer à l'eau



** Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. * Dangereux, respecter les précautions d'emploi.