



Le spécialiste de l'hygiène de l'environnement animal

## Fiche maladie

### → L'hépatite contagieuse canine (Hépatite de Rubarth)

L'hépatite contagieuse canine aussi appelée « hépatite de Rubarth », est une maladie qui affecte **le foie, les reins, les yeux et les poumons du chien**. D'origine virale, cette maladie, très contagieuse, peut se développer très rapidement, entraînant même dans certains cas la mort de l'animal en quelques heures seulement. **Les chiots sont principalement les plus touchés par la maladie**. Le virus est résistant et peut survivre plusieurs mois dans des conditions d'environnement idéales.

### Mode de transmission

L'hépatite contagieuse canine se transmet par **contact direct avec de l'urine infectée, de la salive, des matières fécales ou des parasites externes** (puces, poux,...). La contamination se fait donc de manière très simple et rapide. Par ailleurs, il est important de noter que les chiens malades peuvent contaminer d'autres chiens au moins six mois après leur guérison.



### Symptômes

Les signes cliniques apparaissent généralement après une période d'incubation de 4 à 7 jours. Il existe plusieurs formes de la maladie :

- Une **forme suraiguë** : rapidement fatale avec fièvre, douleur abdominale, abattement et symptômes nerveux
- Une **forme sévère** : fièvre, ictère ou jaunisse (muqueuses de couleur jaune), vomissements, diarrhée
- Une **forme atténuée** : mêmes symptômes mais moins marqués, avec apparition d'oeil bleu dû à une uvéite (inflammation de l'œil avec œdème de la cornée)
- Une **forme chronique** : cirrhose (destruction du foie) avec apparition de liquide abdominal (appelé ascite), perte de poids, atteinte rénale

De plus, environ un animal sur deux touché par la maladie développe seulement une **pharyngite** passant souvent inaperçue. **L'animal est alors contagieux mais rarement diagnostiqué.**

Enfin, parfois la maladie est si grave qu'elle entraîne subitement la mort avant qu'aucun signe n'ait pu se développer.

## Traitement

Comme pour toute maladie virale, il n'y a **pas de traitement spécifique**. On traite en fonction des symptômes et des complications possibles. La mortalité est importante chez les jeunes non vaccinés qui développent volontiers une forme suraiguë ou sévère.



## Comment prévenir la maladie ?

Il existe aujourd'hui un **vaccin capable de prévenir de la maladie**. Cependant, il ne peut se faire avant l'âge de 7 semaines. Autrement dit, pendant cette période, **les chiots sont particulièrement exposés au virus**.

La prévention passe également par le **maintien d'une bonne hygiène générale** qui permet **d'inactiver le virus** ici en cause et de limiter une contamination générale dans les élevages.

Pour cela Saniterpen préconise le **nettoyage régulier des locaux et des matériels** avec le **SANITERPEN DÉTERGENT SURPUISSANT** puis une désinfection rigoureuse de ces mêmes surfaces avec le **SANITERPEN DÉSINFECTANT 90**.



Flacon 1L



Bidon 5L



Flacon 1L



Bidon 5L

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.